



PREPAROS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) – PARA TODOS

- **Chegar 30 minutos** antes do horário agendado
- Trazer **PEDIDO** médico, documento pessoal e **EXAMES ANTERIORES**.

PREPARO DE EXAMES – ANGIOTOMOGRAFIAS (ATC) E TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE

- **Jejum 4 horas**;
- **Trazer exames** prévios relacionados ao exame;
- • Caso tenha tido alguma **reação** alérgica ao contraste ou **alergia a iodo**, informar preparo **anti-alérgico** após consultar a nossa equipe.
- • Paciente **acima de 70 anos** deve trazer a **dosagem - exame de creatinina** realizado 6 meses até a data do exame agendado.
- • **ATENÇÃO:** Paciente em **CRISE de asma NÃO PODERÁ** realizar o exame. Caso necessário, entrar em contato com a equipe de Radiologia: Rúbia, Dra. Ana Paula e demais médicos radiologistas.
- • Paciente **em uso** de METFORMINA, GLIFAGE, GLICOFORMIM, GLUCOPAHGE OU DIMEFOR **SUSPENDER** o uso no dia do exame e no dia subsequente (1 dia após).

PREPARO DE EXAMES – PARA PESQUISA DE CÁLCULO RENAL – URETEROLITÍASE - NEFOLITÍASE

No dia do exame vir com a bexiga cheia.

Jejum de 8hrs.

Na véspera do exame manter uma alimentação mais leve, evitar gorduras como (óleo, queijo, leite, frituras, azeite, manteiga e etc). Evitar bebidas gasosas.

- Tomar 40 gotas de Simeticona (Luftal ou Flagras) de 6/6hrs na véspera do exame (dia anterior: 10h, 16h, 22h). Ao acordar na manhã do exame tomar mais 40 gotas de Simeticona (Luftal ou Flagras).
- Jejum absoluto de 8hrs antes do exame.
- No dia do exame ingerir 06 copos de água para reter a urina, a bexiga deve estar cheia para realização do exame.
- Caso o exame seja realizado no período da tarde, paciente deverá começar tomar a Simeticona no dia anterior a noite e fazer normalmente o jejum absoluto de 8hrs antes do exame. Tomar 40 gotas de Simeticona (Luftal ou Flagras) de 6/6hrs no dia do exame.

ANEXO 1

PREPARO ANTIALÉRGICO:

RECEITUÁRIO

Para:

Uso oral:

1. **Meticorten 20 mg** _____ Ingerir 2 comprimidos 12 horas antes, 2 comprimidos 8 horas antes e 2 comprimidos 2 horas antes.
2. **Allegra 120 mg** _____ Ingerir 1 comprimido 12 horas antes e 1 comprimido 2 horas antes.

Assinatura - CRM